

TIL UW BIGGEN NAAR EEN HOGER NIVEAU



**FORCERIS<sup>TM</sup>**

➤ **ijzertoediening en preventie van  
coccidiose met 1 enkele injectie**





# COCCIDIOSE

Eén van de meest schadelijke ziekten in de varkenshouderij<sup>1</sup>



Diarree



Sterfte




Groeivertraging

**VERLIES  
VAN RENDEMENT**

**Tot  
60%** van de biggen  
geïnfecteerd<sup>2</sup>

Biggen worden geïnfecteerd  
door opname van gesporuleerde  
oöcysten



Vermindering van de oöcyst uitscheiding is essentieel om het risico op klinische en subklinische coccidiose te verminderen




# ANEMIE DOOR IJZERTEKORT

De meest voorkomende deficiëntie bij jonge biggen<sup>1</sup>

## Vaak voorkomend<sup>4</sup>


IJzertekort kan een impact hebben bij meer dan

**30%** van de biggen bij spenen




## Veroorzaakt ziekte<sup>3</sup>

ZWAKKE EN KWETSBARE BIGGEN



Beïnvloedt de  
kwaliteit van de  
immunrespons



Verhoogt  
gevoeligheid  
voor infecties  
en ziekte

IJzergebrek moet gecompenseerd worden door supplementatie.


# FORCERIS™

➤ 1 injectie voor een gezonde start



1 enkele injectie met Forceris™ beschermt biggen tegen anemie door ijzertekort en tegen diarree ten gevolge van coccidiose.

Forceris™ behandeling:



*GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK!*



# FORCERIS™

➤ 1 injectie voor een gezonde start



Injecteerbare combinatie  
van ijzer en toltrazuril



Beschermt biggen tegen  
diarree ten gevolge van  
coccidiose en vermindert  
de oöcyst excretie<sup>5, 7</sup>



Beschermt biggen tegen  
anemie door ijzertekort<sup>6</sup>



Betere inspuitbaarheid  
dan injecteerbare  
ijzerproducten<sup>8</sup>

VRAAG ERNAAR BIJ UW DIERENARTS

## Referenties

1. Mundt, Journal of Animal Protozooses, 2005; 2. Eysker et al., Veterinary Quarterly, 1994; 3. Egeli et al., Acta Veterinaria Scandinavica, 1998; 4. Perri et al., Journal of Swine Health and Production, 2016; 5. Joachim et al., Parasites & Vectors, 2018; 6. Sperling et al. Veterinary Record, 2018; 7. Hiob et al., Veterinary Parasitology, 2019; 8. Ceva, data on file; 9. Valenzuela et al. Journal of Veterinary Behaviour, 2016




# FORCERIS™

DIERVRIENDELIJK EN ARBEIDSBESPAREND

VOOR U!

Dezelfde, vaste dosis voor alle biggen  
(1,5 ml/dier)

- 200 mg ijzer gecombineerd met 45 mg toltrazuril per big
- Onnodig om biggen te wegen
- Vermindert arbeid en arbeidskosten
- Diervriendelijk



Breukresistente CLAS flacon

- Flacon in meerlaags plastic
- Licht en breukresistent
- Ergonomische grip

**Forceris™ 30 mg/ml + 133 mg/ml, suspensie voor injectie voor biggen**

**Werkzame bestanddelen:** Toltrazuril 30,0 mg/ml; IJzer (III) 133,4 mg/ml (als gleptoferron 355,2 mg/ml) **Doeldiersoort:** Varken (biggen 24 tot 96 uur na de geboorte) **Indicaties:** Gelijktijdige preventie van bloedarmoede door ijzertekort en klinische verschijnselen van coccidiose (diarree) evenals vermindering van oöcysten uitscheiding, bij biggen op bedrijven met een bevestigde voorgeschiedenis van coccidiose veroorzaakt door *Cystoisospora suis*. **Contra-indicaties:** Niet gebruiken bij biggen waarvan wordt vermoed dat ze lijden aan een tekort aan vitamine E en/of selenium. **Dosering en toedieningswijze:** 45 mg toltrazuril en 200 mg ijzer per big, d.w.z. 1,5 ml Forceris per big, éénmalige intramusculaire toediening, tussen 24 en 96 uur na de geboorte. **Bijwerkingen:** Sterfgevallen werden zeer zelden gemeld na toediening van parenterale ijzer injecties. **Wachttermijn:** Vlees en slachtafval: 70 dagen **Vergunninghouder:** Ceva Santé Animale, 10 av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Frankrijk **Vergunningsnr:** REG NL 121805 **Kanalisatie:** UDA **Voor meer informatie:** Zie bijsluiter of contacteer Ceva Santé Animale B.V., Tiendweg 8C, 2671 SB Naaldwijk, info@ceva.nl